

BROCUM

IL PRODOTTO

Esca topicida-ratticida pronta all'uso a base di Brodifacoum.

LA COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Brodifacoum puro g 0,005
Cereali, aromi, ecc. q.b. a g 100

IL PRINCIPIO ATTIVO

Il **Brodifacoum** è l'ultimo nato nella famiglia dei rodenticidi anticoagulanti della seconda generazione, efficacissimo contro tutti i tipi di roditori (*Rattus rattus*, *Rattus norvegicus*, *Mus musculus*, ecc.), compresi quelli resistenti agli altri anticoagulanti. Come per gli altri prodotti appartenenti alla classe dei rodenticidi anticoagulanti, la morte del roditore avviene per emorragia interna dopo 4-5 giorni dall'ingestione delle esche e perciò non suscitando diffidenza nei riguardi del prodotto da parte dei consimili. Anche qualora il roditore abbia ingerito una dose di principio attivo molto superiore a quella letale, la morte non viene anticipata.

LE CARATTERISTICHE

BROCUM può essere considerato un "rodenticida a dose singola". Infatti è sufficiente in media un'unica ingestione di meno di 2 grammi di esca per uccidere un ratto e di meno di 0,5 grammi per uccidere un topo. Questa caratteristica produce due importanti vantaggi:
- è più difficile l'insorgenza di resistenze, causata dall'ingestione di quantitativi subletali di principio attivo;
- è sufficiente un basso quantitativo di esca per portare ad un completo controllo dei roditori; inoltre una volta ingerita la dose letale, il roditore smette di cibarsi e conseguentemente di provocare danni.

L'APPLICAZIONE

BROCUM viene rapidamente accettato dalle diverse specie di roditori, grazie agli appetenti e coformulanti alimentari di prima scelta impiegati per la sua formulazione.

Una delle regole essenziali per ottenere buoni risultati, è quella di mantenere a disposizione dei roditori un quantitativo di esche esuberante e disposte in punti vicini fra loro. In questo modo i roditori possono incontrarle e consumarle facilmente, senza dovere entrare in competizione fra loro.

Nella prima fase della derattizzazione è importante che i punti di distribuzione siano spesso controllati (anche giornalmente) per reintegrarli di esca in modo da consentirne un regolare consumo nell'arco dei primi 2-3 giorni.

BROCUM è disponibile in varie formulazioni, che ne permettono l'impiego in ogni condizione (luoghi umidi, locali polverosi, presenza di sorgenti di cibo competitive, ecc), soprattutto se associate all'uso di adatti erogatori (RISTORAT, linea PROTECTA, BAIT DISPENSER, ecc).

LA FORMULAZIONE

BROCUM è disponibile in pellet, farina, fioccolato, grani, frumento, zollette paraffinate, candelotti con gancio paraffinati, bustine sfarinata.

LE INDICAZIONI

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. *Poiché la Colkim non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzazione dello stesso.*

LA REGISTRAZIONE

Presidio Medico - Chirurgico. Per uso civile.
Registrazione Ministero della Sanità n.14352

LA CLASSIFICAZIONE

In base alle norme vigenti in materia di Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura dei preparati pericolosi - BROCUM è classificato NON PERICOLOSO e perciò in etichetta non è riportato alcun simbolo di pericolosità.

Revisione 2 - Agosto 2004 - Pubblicazione riservata a personale sanitario qualificato.

Colkim

Via Piemonte, 50 - 40064 Ozzano Emilia (BO) Italia
Tel. 051.799.445 - 051.798.006 - Fax 051.797.555 - colkim@colkim.it - www.colkim.it

