



Etichetta Ministeriale

Presidio Medico Chirurgico - Reg. Ministero della Sanità n. 18349

MURIN DIFE ESCA GRASSA

Topicida raticida - Pasta in porzioni dosate

Esca avvelenata pronta per l'uso. Per uso domestico e civile

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

Difenacoum 0.005 g

Coformulanti, sostanze appetibili e coloranti q.b. a 100 g

CARATTERISTICHE:

Esca in impasto grasso fortemente aromatizzato, di alta attrattività per topi e ratti in bocconi dosati. Anche con una sola ingestione distrugge topi e ratti di ogni varietà, compresi quelli "resistenti" agli anticoagulanti precedenti. La morte avviene almeno dopo tre giorni dalla ingestione senza dolorosa agonia, non creando allarmi nella comunità. Alla morte segue un processo di mummificazione che riduce gli odori.

MODALITA' D'IMPIEGO:

Posizionare i bocconi tal quali lungo i percorsi segnati dai roditori, possibilmente tra i luoghi di ricovero e le fonti di cibo. Per topi usare 10-30 g ogni 2-4 metri, per ratti usare 100-300 g ogni 5-15 metri. Rinnovare l'esca prima che venga totalmente consumata. Lasciare una dose di esca, debitamente protetta, per monitorare ed intercettare nuovi arrivi. Sostituire immediatamente l'esca qualora si ammuffisse o deteriorasse. All'esterno o dove vi sia possibilità di contatto tra l'esca e bambini o animali non target le esche vanno protette con tegole o altro, o meglio, posizionate all'interno di stazioni o dispenser che, oltre ad impedire il contatto con animali non target, creano un ambiente dove consumare l'esca con tranquillità.

DA NON VENDERSI SFUSO

AVVERTENZE e NORME PRECAUZIONALI:

Conservare il prodotto sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini

Conservare la confezione ben chiusa.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Dopo l'applicazione e in caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego del prodotto.

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.

Da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione.

Nei luoghi frequentati da persone o animali domestici mascherare le esche nel modo più opportuno.

Terminata la disinfestazione distruggere le esche residue o riporle in luogo sicuro.

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI MEDICHE

Sintomi: avvelenamento grave per ingestione. Provoca emorragie cutanee e delle mucose inibendo la Vitamina K1. La sintomatologia a carico di altri sistemi od apparati è prevalentemente emorragica.

Terapia: in caso di ingestione di grosse quantità, provocare il vomito, lavanda gastrica, monitorare attività protrombinica, se diminuisce somministrare Vitamina K1.

Controindicazioni: Anticoagulanti.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

DA NON VENDERSI SFUSO

USO DOMESTICO E CIVILE

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Vebi s.a.s. - Via Desman, 43 - Borgoricco (PD)

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione n. 18349 del Min.della Sanità.

Officina di produzione: VEBI s.a.s. - Borgoricco (PD)

Lotto n e scadenza: vedi fondo confezione

Contenuto: 500 g

VEBI - Via Desman, 43 - 35010 Borgoricco PADOVA - Italy
tel. +39 049 9337111 - fax: +39 049 5798263 - info@vebi.it